

ДИАГНОЗ

Отдельные методы обследования

ДИАГНОЗ – ТЕСТ–ОЦЕНКА СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОСТАТЫ (IPSS)

При появлении ощутимых нарушений мочеиспускания, больные должны обратиться к лечащему врачу или непосредственно к урологу. После описания симптомов проводятся следующие виды обследования.

- Общее медицинское обследование
- Пальцевое ощупывание простаты через прямую кишку (пальцевое ректальное исследование)
- Обследование мочи на следы крови и бактерии
- Анализ крови для определения картины крови, исследования функции почек и печени
- УЗИ (сонография) почек, наполненного мочевого пузыря и простаты с установлением размера ДГП
- Ультразвуковое исследование образования остаточной мочи после мочеиспускания
- Измерение характеристик струи мочи, измерение потока мочи (урофлоуметрия)
- Лабораторное определение уровня ПСА (простатоспецифической сыворотки) крови, помогающее отличить доброкачественное увеличение простаты от ее злокачественного разрастания
- Уретроскопия и цистоскопия (уретральная цистоскопия) при помощи тонкого инструмента (цистоскопа), благодаря которому врач получает возможность видеть простату и мочевого пузырь.

В некоторых случаях проводятся дополнительно

- рентген почек и мочевых путей (урограмма)
- измерение давления в мочевом пузыре (уродинамика)

Когда предоставлены все результаты обследований, проводится обобщающая беседа с врачом. Во время этой беседы обсуждается степень тяжести гиперплазии простаты и в заключение дается консультация о возможностях лечения, терапии.